



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида № 46
«Солнышко»

298310, Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 42

т. (36561) - 6-05-98

Консультация для родителей

«КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЗПР»

Учитель-дефектолог
разновозрастной группы для детей с ЗПР
Субботина Е.В.
Педагогический стаж 9 лет

г. Керчь
2025г.

КОНСУЛЬТАЦИЯ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЗПР

Родителям должны быть известны основные симптомы ЗПР, характерные для того или иного возраста.

1 год - ЗПР не диагностируется в 1 год. Но ряд тревожных звоночков могут указывать на склонность к ней: *по сравнению со сверстниками малыш стал поздно держать голову, садиться, ползать, поворачиваться, вставать на ножки, гулить, ходить; плохо держит предметы; не может скоординировать движения; мало двигается; неэмоционален.*

При этом необходимо учитывать индивидуальные особенности развития малыша и при возникновении сомнений консультироваться с педиатром или невропатологом.

2 года - На отклонения указывают: *незнание собственного имени; отсутствие реакции на простейшие вопросы; обильное слюнотечение; нарушения сна; капризность, плаксивость, раздражительность, агрессия; сложности с удерживанием внимания на определённом предмете.*

3 года - Бедный словарный запас (не более 20 слов); *дефекты речи; отсутствие базовых представлений об окружающем мире (не может назвать животных, предметы быта, части тела); неспособность оформить связную речь; сложности с выполнением элементарных заданий; неразвитое воображение; однотипность действий в игре; невозможность сконцентрироваться; быстрая утомляемость; агрессивность, истерия.*

4 года - В 4 года ЗПР уже чётко диагностируется по конкретным симптомам.

➤ **Физические:** *слабый тонус мышц; кинетоз; нарушения мочеиспускания; головные боли; быстрая утомляемость, слабость, вялость, неподвижность.*

➤ **Познавательные:** *невозможность говорить связно; бедный лексический запас; рассеянное внимание; плохая память; неспособность запоминать информацию наглядно или на слух; отсутствие базовых знаний о мире; несформированность познавательной мотивации.*

➤ **Социальные:** *агрессивность, недоверие, настороженность по отношению к другим; замкнутость, аутизм, погруженность в себя; нежелание участвовать в совместных играх; инфантилизм; перемены настроения.*

Именно в 4 года при своевременном распознавании ЗПР необходимо начинать коррекционную работу. При её отсутствии все эти симптомы в 5-6 лет только нарастают и углубляются.

